

IBICARBOX SUGAR® es un estimulador del metabolismo de las plantas, de aplicación foliar, en base a fósforo (19% P₂O₅) y potasio (10% K₂O) complejados con ácidos carboxílicos de alta pureza y bajo peso molecular. Favorece el crecimiento vegetativo, floración, cuaja, llenado y acumulación de sólidos solubles.

El fósforo entregado por **IBICARBOX SUGAR®** estimula la acción de la enzima almidón hidrolasa, aumentando la síntesis y concentración de azúcares solubles. Por otro lado, el potasio aumenta el potencial osmótico, aumentando el flujo hídrico y de azúcares hacia los frutos.

Se recomienda el uso de **IBICARBOX SUGAR®** para:

- Estimular la acumulación de sólidos solubles en frutos y otros órganos de reserva.
- Activar y estimular un mayor crecimiento vegetativo.
- Antiestresante por daño de agroquímicos, temperaturas y/o plagas.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO	DOSIS ⁽¹⁾
Uva de mesa, Vid Vinífera	Promover el contenido de sólidos solubles y coloración del fruto	Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Cerezo, ciruelos, nogales, almendros, avellanos, durazneros y nectarinos		Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Manzano, Peral		Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Cítricos, Paltos		Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Arándanos, Frambuesas, Frutillas		Aplicar 2 a 3 veces en quiebre de color, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Tomate, Pimiento		Aplicar 2 a 3 veces en maduración del fruto, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo		Aplicar 2 a 3 veces en maduración del fruto, repitiendo cada 10 - 15 días.	400 a 500 cc / HL
Ajo y cebolla	Engorde de bulbos y mejorar condiciones de almacenaje	30, 20 y 10 días antes de cosecha	400 a 500 cc / HL
Papa	Engorde de tubérculos y mejorar condiciones de almacenaje.	30, 20 y 10 días antes de cosecha	400 a 500 cc / HL
Otros	Superar situaciones de estrés	Aplicar luego de una situación de estrés (biótico o abiótico)	400 a 500 cc / HL

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
- Agitar antes de usar.
- Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
- El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
- El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la etiqueta.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com

COMPOSICIÓN GARANTIZADA		
POTASIO (K ₂ O)	10% p/p	- 13,5% p/v
FÓSFORO (P ₂ O ₅)	19% p/p	- 25,65% p/v
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍlicos		

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:	
ASPECTO	Líquido
COLOR	Ámbar
DENSIDAD A 20°C	1,35 g/cc
pH	7,5 - 8,5
SOLUBILIDAD EN AGUA	100%
VISCOSIDAD	< 50 cp
CONTENIDO DE METALES PESADOS	Cadmio (Cd) < 1 mg/Kg; Cromo (Cr) < 1 mg/Kg; Plomo (Pb) < 1 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg; Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico, idealmente llevar la etiqueta del producto.
- Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar la etiqueta durante todo este proceso.