Ibicarbox
POTASIO

AGROXILATO K®
FERTILIZANTE POTASIO

MODO DE USO:
Su aplicación es Fertirriego

IBICARBOX Potasio® es un óxido de potasio (K2O) al 27% p/v complejado con ácidos carboxílicos de gran pureza, de aplicación radicular que potencia la fertilización potásica, aumenta la entrada de agua y nutrientes a la planta, controla la transpiración, mejora el calibre, presión y contenido de sólidos solubles del fruto.

Gracias a su formulación asociada a ácidos carboxílicos, posee una alta velocidad de asimilación, la que provoca una alta presión osmótica en la raíz. Esto favorece la entrada del agua y de los nutrientes del suelo en dirección de las hojas, permitiendo una mayor disponibilidad de estos elementos durante toda la etapa de llenado del fruto.

Además, **IBICARBOX Potasio®** actúa como un regulador osmótico, disminuyendo la incidencia de estrés hídrico

Se recomienda el uso de **IBICARBOX Potasio®** para:
- Potenciar la fertilización potásica.
- Mejorar el calibre y firmeza del fruto.
- Aumentar el contenido de azúcares de los frutos.
- Disminuir la incidencia de estrés hídrico.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	
POTASIO (K_2O)	20% p/p - 27% p/v
COMPLEJADO CON ÁCIDOS CARBOXÍLICOS	

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:	
ASPECTO	Líquido
COLOR	Amarillo
DENSIDAD A 20°C	1,35 g/cc
pH	8,5 - 10
SOLUBILIDAD EN AGUA	100%
VISCOSIDAD	5 cp
CONTENIDO DE METALES PESADOS	Cadmio (Cd) < 1mg/Kg; Cromo (Cr) < 1 mg/Kg; Plomo (Pb) < 1 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg; Arsénico (As) < 1 mg/Kg;

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO	DOSIS(1)
Uva de mesa, uva vinífera.	Potenciar el calibre, firmeza y contenidos de sólidos solubles de fruto.	Aplicar a partir de baya de 5mm.	30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Cerezo, Ciruelos, Nogal, otros carozos		Aplicar luego del endurecimiento de carozo.	30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Manzano, Peral.		Aplicar desde dos meses antes de la fecha estimada de cosecha	30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Cítricos, Paltos.		Aplicar luego de caída fisiológica en etapa de crecimiento del fruto	30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Arándanos, Frambuesas, Frutillas.		Aplicar desde inicios de crecimientos de fruto hasta el final de cosecha.	20 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Tomate, Pimiento.	Potenciar el llenado del fruto	Aplicar desde inicios de crecimientos de fruto hasta el final de cosecha.	30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo.		Aplicar desde inicios de crecimientos de fruto hasta el final de cosecha.	20 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Papa	Mejorar calidad de tubérculos.	Aplicar en etapa de engorde de tubérculos.	30 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.
Otros cultivos	Mejorar el calibre y calidad del fruto.	Aplicar en etapa de crecimiento de fruto.	20 a 40 lt/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 lt/ha Semanalmente.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con productos muy ácidos o con alto poder oxidante.
- Una vez realizada la predisolución del fertilizante base, incorporar en el mismo estanque IBICARBOX POTASIO® en una proporción del 10% del fertilizante potásico utilizado. Es decir, por cada 100 kg de nitrato o sulfato de potasio añadir 10 litros de IBICARBOX POTASIO®
- Agitar antes de usar.
- El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
- El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la etiqueta.
- Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico, idealmente llevar la etiqueta del producto.

Ibiterra
FABRICADO POR IBITERRA LTDA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706