Ibiactive
FOSFITO

FITO K 40/20®

FERTILIZANTE FÓSFORO+POTASIO

MODO DE USO:
Su aplicación es Foliar y Fertirriego

USO FOLIAR · FERTIRRIEGO ·

IBIACTIVE® Fosfito es un abono de aplicación radicular y foliar en base a fósforo (40% P_2O_5) y potasio (20% K_2O) que provee una fuerte acción fungistática y estimula los mecanismos de defensa de la planta. Además, previene deficiencias de fósforo y potasio.

IBIACTIVE® Fosfito aporta fosfito potásico que penetra fácilmente por los canales naturales de ingreso a la planta y se distribuye a través del floema por todo el tejido vegetal. Este compuesto facilita la activación de los mecanismos de defensa de las plantas, elicitando la producción de fitoalexinas, las cuales tienen un efecto antimicrobiano y fungistático.

Se recomienda el uso de **IBIACTIVE® Fosfito** para:

- Fungistático.
- Estimular los mecanismos de defensa naturales de la planta.
- Apoyar la fertilización potásica y fosfórica.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA			
FÓSFORO (P_2O_5)	40% p/p	-	56% p/v
POTASIO (K_2O)	20% p/p	-	28% p/v

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:	
ASPECTO	Líquido
COLOR	Incoloro
DENSIDAD A 20°C	1,4 g/cc
pH	2 - 3
SOLUBILIDAD EN AGUA	100%
VISCOSIDAD	5 cp
CONTENIDO DE METALES PESADOS	Cadmio (Cd) < 1 mg/Kg; Niquel (Ni) < 1 mg/Kg; Cromo (Cr) (total y hexavalente) <1mg/Kg; Plomo (Pb) < 1 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg; Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

DOSIFICACIÓN GENERAL:

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO	DOSIS(cc/HL)	DOSIS(lt/ha)
Uva de mesa	Prevenir y corregir deficiencias de fósforo y potasio.	Aplicar con brotes de 20 a 30 cm y repetir a los 10 a 15 días.	200 a 300 cc / HL	2 a 3 lt/ha
Cerezos, ciruelos, nogales, almendros, avellanos, durazneros y nectarinos		Aplicar en post cosecha y repetir a los 10 a 15 días.	200 a 300 cc / HL	2 a 3 lt/ha
Manzano, Peral		Aplicar 30 y 20 días antes de cosecha y/o después de cada lluvia.	200 a 300 cc / HL	2 a 3 lt/ha
Cítricos, Paltos		Iniciar las aplicaciones si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad, repetir cada 10 a 15 días.	200 a 300 cc / HL	2 a 3 lt/ha
Arándanos, Frambuesas, Frutillas			200 a 300 cc / HL	2 a 3 lt/ha
Tomate, Pimiento			200 a 400 cc / HL	2 a 4 lt/ha
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo			200 a 400 cc / HL	2 a 4 lt/ha
Ajo y cebolla			200 a 400 cc / HL	2 a 4 lt/ha
Papa			200 a 400 cc / HL	2 a 4 lt/ha
Hortalizas			200 a 400 cc / HL	2 a 4 lt/ha
Cultivos			200 a 400 cc / HL	2 a 4 lt/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita.

NOTAS Y ADVERTENCIAS

- Aplicar utilizando suficiente agua para asegurar el mojamiento completo del follaje de las plantas.
- Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto con correctores tipos sales de zinc, dicofol, dimetoato, aceites y cobres.
- No utilizar otras fuentes de fósforo 15 días antes ni durante su utilización.
- Agitar antes de usar.
- El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
- El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la etiqueta.
- Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico, idealmente llevar la etiqueta del producto.

Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar la etiqueta durante todo este proceso.

MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a **info@ibiterra.com**

Ibiterra

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR IBITERRA.
Avenida Las Flores 20101, Pudahuel. Santiago – Chile.
Fonos: (+56) 2 2307 8706

AGITAR ANTES DE USAR ·