

**IBIFORTE®Calcio** es una formulación líquida de calcio (14%) y boro (0,4%) complejado con aminoácidos y ácidos carboxílicos de alta pureza que aseguran una óptima asimilación por los tejidos vegetales. Previene problemas de firmeza y mejora la flexibilidad e integridad de los tejidos.

**IBIFORTE® Calcio** está diseñado como una fuente de calcio en forma pura y de fácil asimilación tanto por frutales como por cultivos, facilitando el uso de este elemento en la construcción de tejidos vegetales y en la formación de frutos firmes y con una mejor vida post cosecha.

Se recomienda el uso de **IBIFORTE®Calcio** para:

- Evitar estrés por exceso de transpiración en post transplante, estadios pre y post florales y en la fase de cuaje de los frutos.
- Prevenir las fisiopatías relacionadas con la asimilación del calcio (bitter pit, blossom end root, tipburn, entre otras).

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

<b>CALCIO (CaO)</b>	14% p/p - 17,6% p/v
<b>BORO (B)</b>	0,4% p/p - 0,5% p/v

**COMPLEJADO CON AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS CARBOXÍLICOS**
**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:**

<b>ASPECTO</b>	Líquido
<b>COLOR</b>	Traslúcido
<b>DENSIDAD A 20°C</b>	1,26 g/cc
<b>pH</b>	5 - 6
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	100%
<b>VISCOSIDAD</b>	5 cp
<b>CONTENIDO DE METALES PESADOS</b>	Cadmio (Cd) < 1 mg/Kg; Níquel (Ni) < 1 mg/Kg; Cromo (Cr) (total y hexavalente) <1mg/Kg; Plomo (Pb) < 1 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg; Arsénico (As) < 1 mg/Kg.

**DOSIFICACIÓN GENERAL:**

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO	DOSIS(cc/HL)	DOSIS(lt/ha)
Uva de mesa	Prevenir y corregir deficiencias de calcio	Aplicar semanalmente desde brote de 50 cm hasta inicios de cuaja	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Cerezo, ciruelos, nogales, almendros, avellanos, durazneros y nectarinos		Aplicar semanalmente desde inicios de floración hasta cuaja.	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Manzano, Peral		Aplicar semanalmente desde inicios de brotación hasta cuaja.	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Cítricos, Paltos		Aplicar semanalmente desde inicios de floración hasta cuaja.	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Arándanos, Frambuesas, Frutillas		Aplicar semanalmente desde yema hinchada hasta inicios de cuaja.	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Tomate, Pimiento		Aplicar semanalmente desde pre-floración hasta inicios de cuaja.	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo		Aplicar semanalmente desde pre-floración hasta inicios de cuaja.	150 a 200 cc / HL	1.5 a 2 lt/ha
Hortalizas	Disminuir estrés post transplante.	Aplicar previo a la cosecha del almácigo y repetir a los 7 días post trasplante	150 cc/ HL	1.5 lt/ha
Cultivos			150 cc/ HL	1.5 lt/ha

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita.

**NOTAS Y ADVERTENCIAS**

- No mezclar con productos que contengan fosfatos, carbonatos, sulfatos o que sean incompatibles con el calcio.
- No mezclar con productos muy alcalinos, por su reactividad y formación de espumas.
- Agitar antes de usar.
- Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
- El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
- El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su

embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la etiqueta.

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico, idealmente llevar la etiqueta del producto.
- Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar la etiqueta durante todo este proceso.

**MÁS INFORMACIÓN**

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas o consultas a [info@ibiterrra.com](mailto:info@ibiterrra.com)